

гриф


TGФ

Союзгеолфонд



ПРИЕМКА ПАСПОРТА				
Географический фонд	Фамилия, И., О.	Должность	Подпись	Дата
Армянский	Саркисян А. А.	инженер	Сарк	23.06.1985

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Масштаб 1:10000



Условные обозначения:

K_{202}		Тамные песчан и слевритис, песчанник полимикт, слеврит.		Транзитовый
K_{201}		песчанник, тиссобретек, тиссо-конец, слитиз абразивен изв. об.		Зона габриггидомально измененных пород.
K_{200}		Мергель, песчанник полимикт, слевритит с прослоями изв.		Разрывные нарушения.
K_{199}		известняк абразивен с редкими прослоями мергеля.		Ртутноносная зона.

топо-гидрографическая схема
Масштаб 1:500 000



- 1 Пр-ние Хосровское
- 2 М-ние Аббасянское
- Населенный пункт
- Автодорога
- Железная дорога
- Реки и водиток
- Граница между союзными республиками
- Граница государственная

001. СЛУЖЕБНЫЕ ДАННЫЕ

Индекс массива	Номер паспорта		Шифр документа	Год со- ставления	Территориальный геологический фонд	1
	ТГФ	Союзгеолфонд				
01	02	03	04	05	06	
Г-1	24			1985	Армянский	

002. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА
(географическая привязка)

003. РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Провинция	Пояс (бассейн)
01	02
Кавказская провинция	
Район (узел)	Поле (группа месторождений)
03	04
Вединский рудный район	Хосровское рудное поле

004. ПОЛОЖЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ

Соединенная республика	(P)	АССР, край, область	(P)	Автономная область, автономный округ	(P)	Район
01		02		03		04
АрмССР						Араратский

005. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН (7)

006. НОМЕНКЛА-
ТУРА ЛИСТА
М-БА 1:200 000

Сев.широта		Вост.долгота		Зал.долгота	
град.	мин.	град.	мин.	град.	мин.
01	02	03	04	05	06
39	59	44	53		

008. АБСОЛЮТ-
НЫЕ ОТМЕТКИ, М
от/до

Длина максимальная, м	Ширина максимальная, м	Площадь, кв.км
01	02	03
1800	1200	2,2

009. РАЗМЕРЫ УЧАСТКА

расположено в бассейне р.Хобров (правый приток р.Веди), 25-26 км СВ от пгт Веди. Район экономически освоен. Развито сельское хозяйство. Электроэнергией обеспечен.

011. ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

Год открытия	Министерство (ведомство)	Объединение, комбинат (экспедиция)
01	02	03
1964	осгеолкомитет	УГ и ОН при СМ АрмССР, Шлиховая партия

012Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ (первооткрыватели, виды методов, работ и др. обстоятельства открытия) Мидян А.Г. (УГ и ОН при
01 Армавир) во время шлюзовой съемки № 1:00000 выявил Хосровское прояв-
ление.

013. ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ

[illegible]

014Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ
ИЗУЧЕННОСТИ ОБЪЕКТА: стадии, виды, методы, объемы, мето-
ды, средства, материалы, оборудование, персонал и др.

291м (всего 1620,5 м), штольни -
1620,5 м, шурфы ср. гл. 5м - 890м,
канавы ср. гл. 3м - 12000 куб. м.
Отобрано 775 шлиховых проб и 592
бороздовых

015. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Названия структур (от крупных - к более мелким)	Виды структур
01	02
Хосровская	антиглиналь
Спитакджурская	антиклиналь

016. ВМЕЩАЮЩАЯ СТРУКТУРА

Название структуры	Вид структуры
01	02

018Т. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (формы и элементы форм рельефа, контроль, теда, полози, ископаем,)

019Т. ГЕНЕЗИС И ВОЗРАСТ Гидротермальный. Послеверхнеэоценовый

020. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ

[illegible]

Q21T. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕШАЮЩИХ ПОРОДАХ

Q21Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О ВМЕШАЮЩИХ ПОРОДАХ (формация, фация, комплекс, свита, толща, мощность, залегание, тектоника, вмещ. порода, выходы, интрузивность, ширина оролов, околоролов, изометрия и др.) Известняки мощн. до 350м сильно трещиноватые. Гидротермально измененные. В пустотах, а также вдоль трещин развиты нарастающие арагонит и друзы кальцита. Контакты бруденел. уч-ков нечеткие, с постепен. переходом к боковым породам. Имеет место окремнение, ожелезнение, карбонатизация, каолинизация.

022. ТЕЛА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Форма тела	(P)	Код-во тел	Направления простирания		Пособ. направ- для падения	Характер залегания	(P)	Длина, м		Ширина, м		Мощность, м		Глубина залегания, м		
			от	до				от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя	от/до	средняя	
01		02	03	04	05	06		07	08	09	10	11	12	13		
килообразная		2	C3	C	303	оч.крутое		130	1150	640	/	0.1	5	1.2	0	100
килообразная		2	B		C	оч.крутое		400	660	530	/	0.1	11	3.2	0	180

0237 ПРОЧНЕ ДАННЫЕ О ТЕЛАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСК

0327. Проведены работы по изучению геологического строения территории, расположенной в границах территории, подлежащей изъятию для государственных нужд Российской Федерации. В результате проведенных работ установлено, что на территории, подлежащей изъятию, залегают осадочные породы, в том числе и рудные. Выведены 4 ртутьносные зоны широтного-поднапряжения. Зона № 1 по составу, структуре, мощности сформирована и обнаружена в 03 кв. 200-250м под назван. зона № 4). Обнаружены в зонах представ. небольш. по разм. гнезд. Помимо первичн. киновари наблюда. в отдельн. частях уч-ка вторичн. киновари, представлен. коллоидными натечными формами.

024. МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ

	Ценные минералы
	01
киноварь	Главные минералы-спутники
	02

лимонит, пирит, халькопирит, арсенопирит, барит, гипс

026. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %

[illegible]

027. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Полезное ископаемое	Р	4	5	Единица измерения содержания	Содержание		Единица измерения запасов	4	5	Запасы	
					от/до	среднее				прогнозные	С2
01				02	03	04	05			06	07
ртуть				%	0,00001 / 3						
					/						
					/						
					/						
					/	1					
					/						
					/						

028. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

[illegible]

030. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА УГЛЯ (СЛАНЦА)

Марка, технологическая группа	Использование угля (сланца) (Р)	W ^a , %		W ^p , %		A ^c , %	
		от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
01	02	03	04	05	06	07	08
		/		/		/	
A ^p , %		V ^c , %		V ^г , %		S ^c , %	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
09	10	11	12	13	14	15	16
/		/		/		/	
P ^c , %		T ^c , %		Q ₈ (Q ₈), ккал/кг		Q _p , ккал/кг	
от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее	от/до	среднее
17	18	19	20	21	22	23	24
/		/		/		/	

031Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
 руды колломорфная, текстура - прожилковая, массивная

Структура

032Т. ПРОЧИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ Результаты геохимического профилирования и шлихового опробования показали, что оруденение киновари в основном приурочено к сильно трещиноватым гидротермально измененным известнякам Туронского возраста в рассеянном виде и отчасти к породам пермского, триасового и эоценового возрастов, представленным песчаниками, известняками, мергелями, не представляющим практического значения.

033Т. ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Незначительные по размеру гнезда и отсутствие оруденения на глубине говорят о неперспективности Хосровского проявления.

034. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ОБ ОБЪЕКТЕ

Документ (Р)	Содержание документа (Р)	Автор (составитель)	Год утвержд (изданий)	Номер хранения документа	
				ТГФ	Союзгеолфонд
01	02	03	04	05	06
отчет	детальные поиски	Антонян Ш.С.	1970	01183	
отчет	регионал. работы	Гурджян А.А.	1974	2991	